

	Ambulansen Mariehamns Räddningsverk	Behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården Mariehamns Räddningsverk	
Utarbetat av: FC-gruppen		Godkänd av: Medicinskt ansv. läkare	Datum: feb 2022 Godkänt till: tillsvidare
		TRA	

FRAKTURER

BEHANDLING

1. Fri luftväg, vid behov SRB
2. Syrgas, 10-12 liter på reserviarmask
3. Stoppa yttre blödningar
4. Venväg, Ringer acetat
5. Inj. Morfin 2 mg/ml i.v upprepas till smärtfrihet, max 8 mg sedan läkarkontakt (syst. BT 90 mmHg)
6. Grovreponera vid uppenbart felställda frakturer med känsel- och/eller cirkulationsstörning, samt vid risk för genomstick. Även **öppna frakturer** reponeras!
7. Fixera frakturen, med skadad extremitet i högläge, om ingen cirkulationspåverkan. Täckförband vid öppna frakturer
8. Vid tilltagande smärta efter fixering → justera fixeringen.

OBS: För amputationsskada, se rubrik
"AMPUTATIONSSKADA"

PRIMÄRBEDÖMNING

A - Luftvägar

B - Andning

C – Cirkulation

- Stoppa yttre blödningar

D – Medvetande

E – Exponering

- Förhindra hypotermi

	Ambulansen Mariehamns Räddningsverk	Behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården Mariehamns Räddningsverk	
Utarbetat av: FC-gruppen		Godkänd av: Medicinskt ansv. läkare	Datum: feb 2022 Godkänt till: tillsvidare
		TRA	

Sekundärbedömning/övervakning

Andning

- Andningsmönster
- AF
- Saturation

Cirkulation

- Pulsfrekvens
- Blodtryck
- Perifer cirkulation
- Distalstatus ("bortom" skadan)

Medvetnade

- Vakenhetsgrad

Smärta

- VAS

Kroppsundersökning

- Övriga skador?

ORSAK

- Trauma
- Vridvåld
- Benskörhet

ANAMNES

- Bedöm skademekanism och grad av våld (hastighet, fallhöjd mm) Inspektera omgivningen, fråga vittnen.
- Medvetslöshet – hur länge?

SYMTOM

- Lokal smärta
- Svullnad, hudmissfärgning
- Öppen fraktur – fri luftförbindelse till skelettdelen
- Sluten fraktur – intakt hud täcker frakturen
- felställning, onaturlig rörelse
- Funktionsnedsättning, känselbortfall
- Nedsatt perifer puls, cirkulationssvikt, chock
- Luxation(er)