

	Ambulansen Mariehamns Räddningsverk	Behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården Mariehamns Räddningsverk	
Utarbetat av: FC-gruppen		Godkänd av: Medicinskt ansv. Läkare	Datum: feb 2022 Godkänt till: tillsvidare TRA

AMPUTATIONSSKADA

BEHANDLING

1. Stoppa stora blödningar. Använd lämplig metod:
 - Tryckförband
 - Tourniquet
 - Combat Gauze
2. Skapa lugn runt patienten.
3. Fri luftväg
4. Syrgas om saturation <93%.
Eftersträva AF <20. Assistera andning vid behov.
5. Vid systoliskt blodtryck <90: Ge Ringer-acetat. Utvärdera effekt.
6. Smärtlindring- morfin 2 mg.
Upprepa v.b. Max 8 mg.
7. Ta hand om amputerad kroppsdel enligt rutan till höger
8. Smärtlindring enl. vårdnivå

PRIMÄRBEDÖMNING

A - Luftvägarna

•

B - Andning

- Säkerställ god syresättning

C - Cirkulation

- Kontrollera cirkulation/blodtryck för att kunna besluta om snabbt påbörjande av vätskebehandling (målsättning syst. BT > 90 mmHg)

D – Medvetande

- AVPU

E – Exponering

Omhändertagande av amputerad kroppsdel:

- Kroppsdelen lindas in i steril kompress eller duk som fuktas med NaCl eller Ringer-acetat.
- Lägg paketet i en plastpåse som knyts fast.
- Kyl ner hela plastpåsen i is/kallt vatten, utan att isen/vattnet kommer i kontakt med kompressen och den amputerade kroppsdelen.

	Ambulansen Mariehamns Räddningsverk	Behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården Mariehamns Räddningsverk		
Utarbetat av: FC-gruppen		Godkänd av: Medicinskt ansv. Läkare	Datum: feb 2022 Godkänt till: tillsvidare	

ORSAK

- Trauma

ANAMNES

- Multitrauma? Finns möjlighet till andra skador?
- Blodförtunnande medicin?
- Försök ta reda på vad som hänt

SYMPTOM

- Smärta
- Andningspåverkan/cirkulatorisk påverkan vid stor blodförlust
- Oro, ångest

ÖVERVAKNING

Andning

- Andningsfrekvens
- Lungauskultation om trauma

Cirkulation

- Puls- frekvens och rytm
- Blodtryck
- Perifer cirkulation

Medvetande

- Temp
- Vakenhetsgrad

Exponering

- Helkroppsundersökning- finns andra skador?